



Prim'Herbe




Schéma de production



- **Type de production** : Engraissement de génisses / boeufs
- **Finition** : à l'auge
- **Age à la vente** : entre 14 et 18 mois
- **Poids de carcasse** : 270 – 330 kg / Etat d'engraissement = 3
- **Races** : RAV x RAV / RAV x autre / Race mixte pure

Schéma de production d'une génisse race à viande type Charolaise à 54% de rendement abattue à 17,5 mois à 565 kg vif




Exemple pour une broutarde charolaise achetée à 8 mois pour 270 kg vif
 Avec des rations équilibrées pour une croissance de 1 100 g/j de GMQ
 Durée d'engraissement : 270 jours pour atteindre 565 kg vif soit 305 kg carcasse

	Prix	Ration 1 : base enrubannage (kg brut/j)	Ration 2 : base maïs + foin (kg brut/j)	Ration 3 : base foin (kg brut/j)	Ration 4 : 2/3 enrubannage + 1/3 maïs (kg brut/j)
Ensilage maïs	100 € T/MS		8		5,5
Enrubannage de PT	120 € T/MS	11			9
Foin	114 € T/MS	1	4	7	
Orge	170 €/T	2,5	2,7	3	2,5
Tourteau colza	285 €/T	1	1,3	1,2	1,2
Minéral	600 €/T	0,1	0,1	0,1	0,1
Prix journalier		1,40 €	1,61 €	1,61 €	1,48 €
Coût total alimentation	Sur 270 j	377 €	435 €	435 €	399 €


Rq : Ces exemples de rationnement sont établis sur des valeurs fourragères bien définies, tout en respectant les exigences du cahier des charges. Il apparaît donc indispensable de **faire analyser vos fourrages avant d'établir une ration cohérente** et en adéquation avec les performances souhaitées par la filière.

1 VACCINER DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE DU VEAU

P = Pasteurelle
IN = Intranasal
V = Vaccin



2 VACCINER APRÈS 3 MOIS



3 VACCINER UN BROUTARD



» Vincent THIRIET Vétérinaire conseil à l'APAL'

Penser à la vaccination entérotoxémie avec un rappel 3 semaines après la première injection !

ÉCOANTIBIO

RÉDUIRE L'UTILISATION DES ANTIBIOTIQUES VÉTÉRINAIRES